

第5章 第二单元 呼吸系统问题

一、最佳选择题

1、中至重度持续性过敏性鼻炎首选治疗药物是

- A、鼻用糖皮质激素
- B、口服糖皮质激素
- C、口服第二代抗组胺药
- D、口服肥大细胞膜稳定剂
- E、口服白三烯受体阻断剂

2、鼻用糖皮质激素用于治疗轻度和中至重度过敏性鼻炎，其用法疗程正确的是

- A、每天喷鼻3~4次，疗程不少于1周
- B、每天喷鼻1~2次，疗程不少于2周
- C、每天喷鼻2次，疗程不少于4周
- D、每天喷鼻1次，疗程不少于4周
- E、每天睡前喷鼻1次，疗程4周以上

3、中至重度持续性过敏性鼻炎患者如通过其他治疗方法无法控制严重鼻塞症状时，可考虑口服糖皮质激素，以下用药指导错误的是

- A、早晨顿服，疗程5~7天
- B、每天用药1次，晚上睡前口服，疗程4周以上
- C、避免用于儿童、老年人以及有糖皮质激素禁忌证的患者
- D、宜选择安全性和耐受性较好的制剂
- E、剂量按患者体重计算（0.5~1.0mg/kg）

4、可能引起Q-T间期延长、尖端扭转型室性心动过速等严重心律失常的药物是

- A、丙酸氟替卡松
- B、孟鲁司特
- C、氯雷他定
- D、色甘酸钠
- E、曲尼司特

5、2岁小儿，夏季，突起高热达39.2℃，流涎，起病以来精神差，厌食，口腔中可见数十个大小灰白色的疱疹，周围有红晕。以下说法不正确的是

- A、病毒性上呼吸道感染者可以自愈
- B、治疗的目的是防止交叉感染及并发症
- C、注意休息，保持良好的周围环境
- D、多饮水，补充维生素C等
- E、若证实为链球菌感染，一般是大环内酯类药物治疗

6、患者，男，35岁，因咽喉肿痛三天就诊，改良Centor评分为4。该患者最可能的感染是

- A、大肠埃希菌
- B、A组β溶血性链球菌
- C、C组β溶血性链球菌
- D、G组链球菌

E、A 组 α 溶血性链球菌

7、患者，男，30 岁，急性链球菌感染，青霉素皮试阴性，有关其抗菌药物使用叙述错误的是

- A、青霉素 V 钾，250mg qid po，疗程 10 天
- B、阿莫西林，500mg bid po，疗程 10 天
- C、头孢氨苄，500mg bid po，疗程 5~7 天
- D、苄星青霉素，120 万单位静脉注射，1 次用药
- E、青霉素 V 钾，500mg bid po 疗程 10 天

8、对于 A 组 β 溶血性链球菌感染引发的急性扁桃体炎，有关抗菌药物的使用错误的是

- A、儿童首选克林霉素
- B、青霉素具有最低的成本、最高的获益
- C、红霉素耐药率较高，仅用于青霉素过敏的患者
- D、若使用阿奇霉素，疗程为 3 天
- E、四环素不宜使用

9、患者，男，5 岁，因急性扁桃体炎引发的咽喉痛服用镇痛药物，建议使用的是

- A、布洛芬
- B、盐水
- C、利多卡因胶浆剂
- D、双氯芬酸钠
- E、可待因

10、下列止咳药物中，适用于患胸膜炎伴胸痛的干咳患者是

- A、可待因
- B、羧甲司坦
- C、苯丙哌林
- D、喷托维林
- E、右美沙芬

11、镇咳药连续口服一般不应超过

- A、1 天
- B、2 天
- C、3 天
- D、5 天
- E、7 天

12、可抑制外周传入神经，亦可部分抑制咳嗽中枢，适用于刺激性干咳或剧烈阵咳的药物是

- A、吗啡
- B、可待因
- C、右美沙芬
- D、喷托维林
- E、苯丙哌林

13、患者女，64岁，10天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服的祛痰药是

- A、洛贝林
- B、氨溴索
- C、氨茶碱
- D、可待因
- E、安钠咖

14、以下所列治疗咳嗽的药物中，能直接抑制延髓的咳嗽中枢，镇咳作用强大而迅速且有镇痛作用的是

- A、可待因
- B、美酚伪麻
- C、苯丙哌林
- D、喷托维林
- E、右美沙芬

15、患儿男12岁，连续3日夜间咳嗽就诊，首选的止咳药是

- A、苯丙哌林
- B、右美沙芬
- C、氨溴索
- D、糖皮质激素
- E、羧甲司坦

16、含右美沙芬制剂的慎用人群是

- A、青光眼患者
- B、银屑病患者
- C、轻度高血压患者
- D、高空作业或操作机器者
- E、糖尿病患者

17、对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感，需整片吞服，不可咀嚼的镇咳药是

- A、右美沙芬
- B、色甘酸钠
- C、苯丙哌林
- D、可待因
- E、羧甲司坦

18、4岁儿童出现发热、鼻塞、流涕等症状，诊断为病毒性感冒，应避免服用含有哪种成分的感冒药

- A、对乙酰氨基酚
- B、阿司匹林
- C、氯苯那敏
- D、布洛芬
- E、金刚烷胺

19、口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药，较为有效的用药时间是症状出现的

- A、48h 内
- B、72h 内
- C、96h 内
- D、108h 内
- E、120h 内

20、作为流行性感的治疗药物，目前常用的病毒神经氨酸酶抑制剂是

- A、杆菌肽
- B、阿昔洛韦
- C、扎那米韦
- D、奥司他韦
- E、金刚乙胺

21、患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，近日因发热（39℃）、头痛、全身肌肉与关节酸痛、乏力、食欲减退等症状就诊，临床诊断为流行性感冒，首选的抗病毒药物是

- A、奥司他韦
- B、阿比多尔
- C、金刚烷胺
- D、金刚乙胺
- E、阿昔洛韦

22、患者，男，36 岁，因流感服用血凝素抑制剂阿比多尔，正确的服用方法是

- A、用量为每次 200mg，每日 3 次，疗程 5 天
- B、用量为每次 100mg，每日 3 次，疗程 5 天
- C、用量为每次 200mg，每日 3 次，疗程 7 天
- D、用量为每次 200mg，每日 4 次，疗程 3 天
- E、用量为每次 100mg，每日 3 次，疗程 7 天

23、流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。以下关于流感疫苗接种的注意事项，叙述错误的是

- A、使用减毒流感活疫苗 2 周内不应服用磷酸奥司他韦
- B、服用磷酸奥司他韦后 48 小时内不应使用减毒流感活疫苗
- C、灭活流感疫苗可以在服用磷酸奥司他韦前、后的任何时间使用
- D、同一流感流行季节，已按照接种程序完成全程接种的人员，无需重复接种
- E、在母乳喂养期，母亲接种流感疫苗需暂停母乳 2 周

24、奥司他韦最受关注的不良反应是

- A、消化系统损害
- B、神经精神紊乱
- C、全身性损害
- D、外周神经系统损害
- E、皮肤及其附件损害

25、普通感冒是最常见的急性上呼吸道感染性疾病，目前尚无特效的抗病毒药物，故以对症治疗、缓解症状为主，以下关于普通感冒一般治疗的描述，错误的是

- A、药物治疗时应首选口服药物，避免无根据的盲目静脉补液
- B、由于潜在的危害和受益证据缺乏，3岁以下儿童不应使用非处方抗感冒药
- C、预防普通感冒最有效方法是洗手，使用洗手液或肥皂洗手，每次时间至少15~30秒
- D、治疗成人感冒症状可使用抗组胺药的单一疗法
- E、抗菌药物对成人和儿童的普通感冒无效，不宜使用
- 26、患者，男，6岁，因发热(38.6℃)、鼻塞、流清涕、咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计数正常，淋巴细胞比例相对增加。临床诊断为普通感冒。关于该患者的治疗叙述错误的是
- A、睡前可在胸部和颈部涂抹樟脑软膏，缓解鼻塞，降低夜间咳嗽
- B、退热可使用对乙酰氨基酚
- C、若患者持续发热，可推荐同时服用对乙酰氨基酚与布洛芬
- D、每天使用6次生理盐水冲洗患者鼻腔，缓解鼻塞症状
- E、睡前服用蜂蜜可以减少咳嗽的频率
- 27、患者，男，65岁，冠心病史3年，近日因低热、头痛、鼻塞、流清涕、咳嗽就诊，诊断为普通感冒。该患者适宜使用的治疗药物是

- A、对乙酰氨基酚
- B、阿司匹林
- C、布洛芬
- D、双氯芬酸
- E、麻黄碱
- 二、配伍选择题

1、(治疗咳嗽的药物)

- A. 氨溴索
- B. 氨茶碱
- C. 可待因
- D. 喷托维林
- E. 右美沙芬复方制剂

<1>、咳嗽较弱者可选用的药物是

A B C D E

<2>、痰液较多者应服用的祛痰药物是

A B C D E

<3>、治疗感冒所伴随的咳嗽可选用的药物是

A B C D E

<4>、尤其适用于胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者的药物是

A B C D E

2、(常见症状的自我药疗)

- A. 黄连素
- B. 可待因
- C. 苯丙哌林
- D. 卡马西平
- E. 对乙酰氨基酚

<1>、三叉神经痛首选的是

A B C D E

<2>、刺激性干咳或阵咳症状为主者宜用

A B C D E

<3>、12岁以下儿童禁用的镇咳药物是

A B C D E

三、综合分析选择题

1、患儿，6岁。昨日开始发热，咽痛，腹痛，口服速效感冒胶囊，热退，今晨又发热。体检：颜面潮红，口周苍白，咽部充血。双扁桃腺肿大，表面有脓性分泌物，躯干皮肤见红色细小丘疹。WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 83%。

<1>、诊断最可能为

A、麻疹

B、风疹

C、药疹

D、肠道病毒感染

E、化脓性扁桃体炎

<2>、治疗首选

A、红霉素

B、头孢唑啉

C、氯霉素

D、青霉素

E、磷霉素

2、患者，男，72岁，糖尿病病史3年，因发热(38.6°C)、头痛、鼻塞、流清涕、咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计数正常。临床诊断为普通感冒。

<1>、治疗该患者发热、头痛，首选的治疗方法是

A、对乙酰氨基酚，一次0.4g，qid

B、阿司匹林，一次0.4g，tid

C、布洛芬，一次0.4g，qid

D、贝诺酯，一次0.4g，tid

E、20%安乃近溶液滴鼻

<2>、患者自行服用酚麻美敏片、维C银翘片，三天后出现急性尿潴留，可引起该患者尿潴留的药物成分是

A、对乙酰氨基酚

B、伪麻黄碱

C、维生素C

D、右美沙芬

E、氯苯那敏

四、多项选择题

1、患者，男，53岁，糖尿病史3年，近期因为咽喉痛而向社区药房的药师咨询，药师应对患者病情进行评估，属于哪种情况应建议患者及时就医

A、高热、一般状态较差

B、软腭肿胀

C、血糖控制不佳

D、鼻音浓重

E、已使用 1 周的抗菌药物，而症状未改善

2、针对 A 组 β 溶血性链球菌感染引发的急性扁桃体炎，不宜常规使用的抗菌药物有

A、青霉素 V 钾

B、四环素

C、磺胺甲噁唑

D、氧氟沙星

E、克林霉素

3、对于呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道时，可选用哪种药物使痰液易于排出

A、氨溴索

B、愈创木酚甘油醚

C、乙酰半胱氨酸

D、可待因

E、羧甲司坦

4、下列关于咳嗽用药的叙述正确的是

A、对于痰液较多的咳嗽应以镇咳为主

B、对于湿性咳嗽，应慎重给药，以免加重感染

C、支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药

D、右美沙芬可引起嗜睡

E、苯丙哌林须整片吞服

5、以下有关治疗咳嗽用药注意事项中，正确的是

A、苯丙哌林对口腔黏膜有麻醉作用

B、干性咳嗽可单用镇咳药

C、右美沙芬对口腔黏膜有麻醉作用

D、痰液较多的咳嗽患者应以祛痰为主

E、镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解应去就诊

6、患者，男，45 岁，因流感症状服用磷酸奥司他韦，关于该药物的用药指导错误的是

A、建议单一服用，无需联合用药

B、为尽快达到治疗效果，可剂量加倍

C、服用磷酸奥司他韦 48 小时内不应使用减毒流感活疫苗

D、提醒患者关注药物引发的神经精神异常

E、提倡与其他抗病毒药物联合用药，减轻药物不良反应

答案部分

一、最佳选择题

1、

【正确答案】 A

【答案解析】 鼻用糖皮质激素是过敏性鼻炎的一线治疗药物。临床可用于轻度和中至重度过敏性鼻炎的治疗，按推荐剂量每天喷鼻1~2次，疗程不少于2周；对于中至重度持续性过敏性鼻炎是首选药物，疗程4周以上。持续治疗的效果明显优于间断治疗。

2、

【正确答案】 B

【答案解析】 鼻用糖皮质激素临床可用于轻度和中至重度过敏性鼻炎的治疗，按推荐剂量每天喷鼻1~2次，疗程不少于2周；对于中至重度持续性过敏性鼻炎是首选药物，疗程4周以上。持续治疗的效果明显优于间断治疗。

3、

【正确答案】 B

【答案解析】 口服糖皮质激素是过敏性鼻炎的二线治疗药物。中至重度持续性过敏性鼻炎患者如通过其他治疗方法无法控制严重鼻塞症状时，可考虑短期口服糖皮质激素。早晨顿服，疗程5~7天。

4、

【正确答案】 C

【答案解析】 口服抗组胺药罕见发生心脏毒性作用，但应引起重视，临床表现为Q-T间期延长、尖端扭转型室性心动过速等严重心律失常。

5、

【正确答案】 E

【答案解析】 针对链球菌感染，青霉素是首选的抗菌药物，具有最低的成本、最高的获益，特别是在儿童和青少年患者中。大环内酯类药物仅用于青霉素过敏的患者。

6、

【正确答案】 B

【答案解析】 A组β溶血性链球菌是咽炎患者最常见的细菌性病原体，青霉素是首选的抗菌药物，具有最低的成本、最高的获益，特别是在儿童和青少年患者中。

7、

【正确答案】 D

【答案解析】 苄星青霉素单次肌肉注射，不是静脉注射，D错误。

8、

【正确答案】 A

【答案解析】 A组β溶血性链球菌是急性扁桃体炎最常见的细菌性病原体，青霉素是首选的抗菌药物，具有最低的成本、最高的获益，特别是在儿童和青少年患者中。

9、

【正确答案】 A

【答案解析】 对于咽喉痛的患者可使用非甾体抗炎药，如布洛芬、双氯芬酸钠等。盐水、利多卡因胶浆剂和其他类似混合制剂的治疗证据不足。儿童患者不建议使用双氯芬酸钠，目前证据不足以证明其安全性。

10、

【正确答案】 A

【答案解析】 可待因能直接抑制延髓的咳嗽中枢，镇咳作用强大而迅速，同时具有镇痛和镇静作用，尤其适用于伴有胸痛的干咳患者。

11、

【正确答案】 E

【答案解析】 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失应向医师咨询。

12、

【正确答案】 E

【答案解析】 苯丙哌林非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，镇咳效力为可待因的 2~4 倍。可抑制外周传入神经，亦可部分抑制咳嗽中枢，适用于刺激性干咳或剧烈阵咳。成人，一次 20 ~ 40mg，一日 3 次。

13、

【正确答案】 B

【答案解析】 对呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道，引起气急、窒息者，可及时应用司坦类黏液调节剂如羧甲司坦或祛痰剂如氨溴索，以降低痰液黏度，使痰液易于排出。

14、

【正确答案】 A

【答案解析】 可待因能直接抑制延髓的咳嗽中枢，镇咳作用强大而迅速，同时具有镇痛和镇静作用，尤其适用于伴有胸痛的干咳患者。

15、

【正确答案】 B

【答案解析】 右美沙芬是目前临床上使用最广的镇咳药，属于非依赖性中枢镇咳药，镇咳作用与可待因相似，但无镇痛作用，治疗剂量对呼吸中枢无抑制作用，亦无成瘾性。比相同剂量的可待因作用时间长，故能抑制夜间咳嗽以保证睡眠。

16、

【正确答案】 D

【答案解析】 右美沙芬可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用。

17、

【正确答案】 C

【答案解析】 苯丙哌林对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感觉，需整片吞服，不可嚼碎。

18、

【正确答案】 B

【答案解析】 儿童病毒性感染所引起的发热使用阿司匹林退热，有可能引起 Reye's 综合征，应避免使用。

19、

【正确答案】 A

【答案解析】 重症病例或有重症流感高危因素的患者，应尽早给予抗流感病毒治疗，不必等待病毒核酸检测结果，发病 48 小时内进行抗病毒治疗可减少并发症、降低病死率、缩短住院时间；但发病时间超过 48 小时的重症患者依然可从抗病毒治疗中获益。

非重症病例且无重症流感高危因素的患者，发病 48 小时内，在评价风险和获益后，也可考虑抗病毒治疗。

20、

【正确答案】 D

【答案解析】 我国目前上市的药物：

神经氨酸酶抑制剂——奥司他韦

血凝素抑制剂——阿比多尔

M₂离子通道阻滞剂——金刚烷胺、金刚乙胺

21、

【正确答案】 A

【答案解析】 已在临床观察研究中发现怀孕期间感染流感后会起不良的临床结局，因此，孕妇在流感流行季节应接受三价或四价流感疫苗注射；如果怀疑或确诊流感，建议尽早启动经验性抗病毒治疗，通常首选奥司他韦。

22、

【正确答案】 A

【答案解析】 血凝素抑制剂阿比多尔可用于成人甲型、乙型流感的治疗。用量为每次 200mg，每日 3 次，疗程 5 天。我国临床应用数据有限，需密切观察疗效和不良反应。

23、

【正确答案】 E

【答案解析】 在母乳喂养期，母亲接种流感疫苗对母亲和婴儿都是安全的。

24、

【正确答案】 B

【答案解析】 奥司他韦的神经精神异常表现多样，包括头晕、头痛、幻觉、行为异常、嗜睡、谵妄和焦虑等，严重者可发展为抑郁甚至自杀；因此，奥司他韦引起的神经精神异常是该药最受关注的不良反应；在使用该药物治疗期间，应该对患者的自我伤害和谵妄事件等异常行为进行密切监测，特别是儿童和青少年。

25、

【正确答案】 D

【答案解析】 治疗成人感冒症状有效的药物仅限于非处方解热镇痛药和减轻鼻充血药，联用或不联用抗组胺药，但不包括抗组胺药单一疗法。

26、

【正确答案】 C

【答案解析】 不推荐对乙酰氨基酚联合布洛芬用于儿童退热，也不推荐对乙酰氨基酚与布洛芬交替用于儿童退热。阿司匹林及其衍生物不推荐作为退热药在儿童中使用。

27、

【正确答案】 A

【答案解析】 心脑血管疾病患者常用阿司匹林作为二级预防用药，故建议使用对乙酰氨基酚解热、镇痛，不建议使用其他非甾体抗炎药。也不建议使用口服减轻鼻充血药麻黄碱。

二、配伍选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 咳嗽频繁或程度剧咳者宜选苯丙哌林，其为非麻醉性强效镇咳药，奏效迅速，动物实验证明本品镇咳效力比可待因强 2~4 倍；次选右美沙芬，与相同剂量的可待因大体相同或稍强；咳嗽较弱者选用喷托维林，其对咳嗽中枢有直接抑制作用，其镇咳作用为可待因的 1/3。大剂量可使痉挛的支气管松弛，降低呼吸道阻力。

【正确答案】 A

【答案解析】 对呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道，引起气急、窒息者，可及时应用司坦类黏液调节剂如羧甲司坦或祛痰剂如氨溴索，以降低痰液黏度，使痰液易于排出。

【正确答案】 E

【答案解析】 对感冒所伴随的咳嗽常选用右美沙芬复方制剂，可选服氨酚伪麻美芬片 II / 氨麻苯美片、美扑伪麻片、酚麻美敏片、双酚伪麻、美息伪麻、伪麻美沙芬等制剂。

【正确答案】 C

【答案解析】 对频繁、剧烈无痰干咳及刺激性咳嗽，可考虑应用可待因，其能直接抑制延髓的咳嗽中枢，镇咳作用强大而迅速，其强度约为吗啡的 1/4，尤其适用于胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者。成人，一次 15～30mg，一日 1～3 次；12 岁以下儿童禁用。

2、

【正确答案】 D

【答案解析】 三叉神经痛首选卡马西平、加巴喷丁。

【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽症状：以刺激性干咳或阵咳症状为主者宜选苯丙哌林，一次 20～40mg，一日 3 次。

【正确答案】 B

【答案解析】 12 岁以下儿童禁用可待因。

三、综合分析选择题

1、

【正确答案】 E

【答案解析】 患儿白细胞升高，最可能是细菌性扁桃体炎。

【正确答案】 D

【答案解析】 急性细菌性扁桃体炎，最主要的病原体均是 A 组 β 溶血性链球菌，即化脓性链球菌。青霉素是首选的抗菌药物，具有最低的成本、最高的获益，特别是在儿童和青少年患者中。

2、

【正确答案】 A

【答案解析】 对乙酰氨基酚对中枢神经系统前列腺素合成的抑制作用比对外周前列腺素合成的抑制作用强，解热作用强，镇痛作用较弱，但作用缓和而持久，对胃肠道刺激小，正常剂量下较为安全有效，大剂量对肝脏有损害，可作为退热药的首选。成人一次 0.3～0.6g，每隔 4 小时 1 次，或一日 4 次，用于退热一日安全剂量不宜超过 2g。

【正确答案】 E

【答案解析】 酚麻美敏片、维 C 银翘片均有氯苯那敏成分，有抗胆碱作用，表现为口干；对闭角型青光眼者可引起眼压增高；对患有良性前列腺增生症的老年男性者可能引起尿潴留，给药时应予注意。

四、多项选择题

1、

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 患者经常因为咽喉痛而向社区药房的药师咨询，药师应对患者病情进行评估，属于以下情况之一应建议患者及时就医：①全身性反应、高热、一般状态较差。②有风湿热病史。③ 15 岁以下。④基础疾病控制不佳的患者（如糖尿病、免疫抑制）。⑤发音障碍超过 3 周的患者。⑥软腭肿胀或鼻音浓重。⑦已使用 1 周的抗菌药物，而症状未改善。

2、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 针对 A 组 β 溶血性链球菌感染，不应使用复方磺胺甲噁唑和四环素类，因为抗菌有效性不足并可能增加不良反应。呼吸喹诺酮类药物对 A 组链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对喹诺酮类药物的耐药性，不建议用于常规治疗。

3、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 祛痰治疗可提高咳嗽对气道分泌物的清除效率。

对呼吸道有大量黏痰的患者，应及时服用祛痰药与黏痰调节剂，如愈创木酚甘油醚、羧甲司坦、氨溴索、乙酰半胱氨酸等，以降低痰液黏稠度，使痰液易于排出。

4、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 A 错误的原因：咳嗽分为干咳或湿咳，对于干咳可单用镇咳药；对痰液较多的咳嗽应以祛痰为主，不宜单纯使用镇咳药，应与祛痰剂合用，以利于痰液排出和加强镇咳效果。对痰液特别多的湿性咳嗽，应该慎重给药，以免痰液排出受阻而滞留于呼吸道内或加重感染。

5、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查治疗咳嗽用药的注意事项。苯丙哌林对口腔黏膜有麻醉作用（A）。干性咳嗽可单用镇咳药（B）。痰液较多的咳嗽患者应以祛痰为主（D）。镇咳药连续口服不宜超过 1 周，症状未缓解应停用就诊（E）。备选答案 C 错误，应为“右美沙芬可引起嗜睡”。

6、

【正确答案】 BE

【答案解析】 没有证据表明在流感病毒感染引起的严重疾病患者中剂量加倍会更有效。神经氨酸酶抑制剂不需要联合其他药物使用，建议单一用药。